

**FlexTouch®**



Fármaco/Princípio ativo	Insulina Asparte com Nicotinamida
Concentração	100 U/mL
Apresentação/Descrição do produto	Solução injetável de insulina asparte 100 U/mL, disponível em sistema de aplicação preenchido com 3 mL. Cada embalagem contém 1 sistema de aplicação (FlexTouch®)
Forma farmacêutica	Solução injetável
Prazo de validade	30 meses
Classe terapêutica	Antidiabéticos (Insulina)
Indicação terapêutica	Melhorar o controle glicêmico em adultos e crianças maiores de 1 ano de idade com diabetes <i>mellitus</i> .
Medicamento controlado? Se sim, qual lista?	Não
Cuidados de conservação	<b>Antes do primeiro uso:</b> Armazenar sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Mantenha distante do compartimento do congelador. Não congelar. Mantenha o sistema de aplicação tampado para protegê-lo da luz. Este medicamento tem prazo de validade de 30 meses. Após o primeiro uso ou carregado como reserva: Válido por 4 semanas, quando armazenado em temperaturas de até 30°C ou sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Não congelar. Mantenha o sistema de aplicação tampado para protegê-lo da luz. Não armazene o produto sob temperaturas acima de 30°C.
Contraindicação de bula	Hipersensibilidade a substância ativa ou a qualquer um dos excipientes (vide seção “Composição”): fenol, metacresol, glicerol, acetato de zinco, fosfato de sódio dibásico di-hidratado, cloridrato de arginina, nicotinamida, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água para injetáveis); Pacientes apresentando sintomas de hipoglicemia (vide seção “9. Reações Adversas”)
O medicamento pode ser fracionado?	Não
Programa de Benefício em Medicamentos	Sim - Programa NovoDia

**Penfill®**



Fármaco/Princípio ativo	Insulina Asparte com Nicotinamida
Concentração	100 U/mL
Apresentação / Descrição do produto	1 mL da solução contém 100 Unidades (U) (equivalente a 3,5 mg) de insulina asparte. Cada carpule contém 300 U de insulina asparte em 3 mL de solução injetável.
Forma farmacêutica	Solução injetável
Prazo de validade	30 meses
Classe terapêutica	Antidiabéticos (Insulina)
Indicação terapêutica	Melhorar o controle glicêmico em adultos e crianças maiores de 1 ano de idade com diabetes <i>mellitus</i> .
Medicamento controlado? Se sim, qual lista?	Não
Cuidados de conservação	<b>Antes do primeiro uso:</b> Armazenar sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Mantenha distante do compartimento do congelador. Não congelar. Mantenha o sistema de aplicação tampado para protegê-lo da luz. Este medicamento tem prazo de validade de 30 meses. Após o primeiro uso ou carregado como reserva: Válido por 4 semanas, quando armazenado em temperaturas de até 30°C ou sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Não congelar. Mantenha o sistema de aplicação tampado para protegê-lo da luz. Não armazene o produto sob temperaturas acima de 30°C.
Contraindicação de bula	Hipersensibilidade a substância ativa ou a qualquer um dos excipientes (vide seção “Composição”): fenol, metacresol, glicerol, acetato de zinco, fosfato de sódio dibásico di-hidratado, cloridrato de arginina, nicotinamida, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água para injetáveis); Pacientes apresentando sintomas de hipoglicemia (vide seção “9. Reações Adversas”)
O medicamento pode ser fracionado?	Não
Programa de Benefício em Medicamentos	Sim - Programa NovoDia

**Frasco**



Fármaco/Princípio ativo	Insulina Asparte com Nicotinamida
Concentração	100 U/mL
Apresentação / Descrição do produto	Solução injetável de insulina asparte 100 U/mL, disponível em frasco-ampola com 10 mL. Cada embalagem contém 1 frasco-ampola.
Forma farmacêutica	Solução injetável
Prazo de validade	30 meses
Classe terapêutica	Antidiabéticos (Insulina)
Indicação terapêutica	Melhorar o controle glicêmico em adultos e crianças maiores de 1 ano de idade com diabetes <i>mellitus</i> .
Medicamento controlado? Se sim, qual lista?	Não
Cuidados de conservação	<b>Antes do primeiro uso:</b> Armazenar sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Mantenha distante do compartimento do congelador. Não congelar. Mantenha o sistema de aplicação tampado para protegê-lo da luz. Este medicamento tem prazo de validade de 30 meses. Após o primeiro uso ou carregado como reserva: Válido por 4 semanas, quando armazenado em temperaturas de até 30°C ou sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Não congelar. Mantenha o sistema de aplicação tampado para protegê-lo da luz. Não armazene o produto sob temperaturas acima de 30°C.
Contraindicação de bula	Hipersensibilidade a substância ativa ou a qualquer um dos excipientes (vide seção “Composição”): fenol, metacresol, glicerol, acetato de zinco, fosfato de sódio dibásico di-hidratado, cloridrato de arginina, nicotinamida, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água para injetáveis); Pacientes apresentando sintomas de hipoglicemia (vide seção “9. Reações Adversas”)
O medicamento pode ser fracionado?	Não
Programa de Benefício em Medicamentos	Não

[Clique aqui e acesse a bula de Fiasp®](#) →