


**Saxenda**<sup>®</sup>


Fármaco/Princípio ativo	Liraglutida
Concentração	6,0 mg/mL
Apresentação/Descrição do produto	Solução injetável de liraglutida 6 mg/mL, disponível em sistema de aplicação preenchido com 3 mL cada. O sistema de aplicação Saxenda <sup>®</sup> pode dispensar doses de 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg ou 3,0 mg. Cada embalagem contém 3 sistemas de aplicação.
Forma farmacêutica	Solução injetável (injeção subcutânea)
Prazo de validade	30 meses
Classe terapêutica	Outros Hormônios e Moduladores do Metabolismo e da Digestão (análogo de GLP-1)
Indicação terapêutica	Adultos: Saxenda <sup>®</sup> é indicado em associação a uma dieta hipocalórica e aumento do exercício físico para controle crônico de peso em adultos com Índice de Massa Corporal (IMC) de: 30 kg/m <sup>2</sup> ou maior (obesidade) ou; 27 kg/m <sup>2</sup> ou maior (sobrepeso) na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como disglícemia (pré-diabetes e diabetes <i>mellitus</i> tipo 2), hipertensão arterial, dislipidemia ou apneia obstrutiva do sono. Adolescentes (≥ 12 anos): Saxenda <sup>®</sup> pode ser utilizado em associação a aconselhamento de nutrição saudável e atividade física para controle de peso em adolescentes a partir de 12 anos com: peso corporal acima de 60 kg e obesidade (IMC correspondendo a ≥;30 kg/m <sup>2</sup> para adultos por pontos de corte internacionais).
Medicamento controlado? Se sim, qual lista?	Não
Cuidados de conservação	Antes do primeiro uso: Armazenar sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Manter distante do compartimento do congelador. Não congelar. Este medicamento tem prazo de validade de 30 meses. Assim que iniciar o uso: Após o primeiro uso, válido por 1 mês, quando armazenado em temperatura ambiente abaixo de 30°C ou sob refrigeração (entre 2°C e 8°C), longe do compartimento do congelador. Não congelar. Quando não estiver em uso, o sistema de aplicação deve permanecer tampado para proteger da luz.
Contraindicação de bula	Hipersensibilidade à liraglutida ou a qualquer excipiente (vide "Composição". (Excipientes: fosfato de sódio dibásico di-hidratado, propilenoglicol, fenol, hidróxido de sódio (ajuste de pH), ácido clorídrico (ajuste de pH) e água para injetáveis).
O medicamento pode ser fracionado?	Não
Programa de Benefício em Medicamentos	Sim

[Clique aqui e acesse a bula de Saxenda<sup>®</sup>](#) →